

EKOLAK J: Šema napajanja jaradi, lit. po napoju

Uzrast	Broj napoja	Kozje mleko	Zamena za mleko
1. dan	4	0,100	-
2. dan	4	0,125	-
3. dan	4	0,135	-
4. dan	4	0,150	-
5. dan	4	0,175	-
6. dan	4	0,200	-
7. dan	4	0,225	-
2. nedelja	4	0,135	0,135
3. nedelja	3	-	0,375
4. nedelja	2	-	0,550
5. nedelja	2	-	0,600
6. nedelja	2	-	0,650
7. nedelja	2	-	0,700
8. nedelja	1	-	0,700

Rastvaranje praha zamene za mleko u vodi obavlja se u odnosu: 150gr praha na 1 litar vode. Zamena za mleko u prahu prethodno se rastvara u manjoj količini vode na temperaturi od 45-50°C i meša do nestanka grudvica, a potom se dodaje preostali deo potrebne vode.

Temperatura rastvorene zamene za mleko je 36-40°C.

Sudove za rastvaranje zamene za mleko i kofe za napajanje oprati deterdžentom posle upotrebe i isprati mlakom vodom pre upotrebe.

Od 2. do 8. nedelje uzrasta jaradima treba davati početnu smešu koncentrata po volji, sa 18-20% ukupnih proteina. Poželjno je da smeša bude peletirana (prečnik pelete 4mm).

Voditi pažnju o higijeni pojilica i hranilica. Za napajanje koristiti čistu i svežu vodu.

Kvalitetno seno uključiti u obrok između 3. i 4. nedelje uzrasta i davati ga po volji.